

Védőnői tájékoztató a BCG védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegség ellen véd a BCG védőoltás?

Az újszülöttkori BCG oltás a gyermekek súlyos tuberkulózisa ellen ad védelmet.

Milyen betegség a tuberkulózis?

A tuberkulózis (TBC), más néven gümőkór egy baktérium okozta fertőző betegség.

Hogyan terjed a tuberkulózis?

A tuberkulózis cseppfertőzéssel (pl. köhögés) terjed, de fertőzött állatok nyers teje is közvetítheti.

Melyek a TBC tünetei?

Elhúzódó láz és köhögés, nyirokcsomó megnagyobbodás. Az immunrendszer állapotától függően a kórokozó elterjedhet a szervezetben nehezen gyógyítható súlyos betegséghez, akár halálhoz vezethet.

Mikor esedékes a BCG oltás?

Az újszülöttek a kórház elhagyása előtt kapják meg a védőoltást, a védettség kialakításához egyszeri oltás szükséges. Amennyiben a szülészeti intézményben az újszülött nem kapta meg az oltást, illetőleg nem intézményben született, akkor 4 héten belül, folyamatos oltás keretében szükséges azt pótolni. Speciális esetekben a szülészeti intézményben elmaradt BCG oltást minél korábbi életkorban, de maximum 1 éves korig kell elvégezni.

Mire számíthatok a BCG oltást követően?

Normál reakció esetén az oltást követő 2-4 hét múlva maximum 10 mm átmérőjű vörös csomó képződik az injekció helyén, amely maximális nagyságát 4-6 héttel az oltás után éri el. A csomó közepe gyakran pörkösödik vagy gennyesedik, amely lassan kitisztul és legkésőbb 4 hónappal az oltás után kis, fehér heggel gyógyul. Ezzel egy időben a hónalji és nyaki nyirokcsomók enyhe duzzanata is előfordulhat. Nagyon ritkán 3-4 héttel az oltás után 1-2 hétig hőemelkedés észlelhető. Amennyiben az oltási hely 10 mm-nél nagyobb vagy a hónalji nyirokcsomóban tályog képződik, arról értesíteni kell a gyermek háziorvosát. Akinél az oltást követően nem alakul ki heg, annak sem szükséges újraoltás.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy mivel gyermeke nem kapta meg a védőoltást a kórházban / olyan helyen született, ahol ezt nem kaphatta meg, vegye fel a kapcsolatot a intézménnyel, majd az egyeztetett időpontban vigye el oda a gyermekét, hogy megkaphassa a BCG védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a BCG oltás beadására kijelölt intézmény ad tájékoztatást. Az oltóanyag alkalmazási előírata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A BCG védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása