

Védőnői tájékoztató a pneumococcus okozta betegségek és a bárányhimlő elleni védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltás

Mikor esedékes a pneumococcus elleni védőoltás?

A védőoltást betöltött 2 és 4 hónapos korban kapják meg a csecsemők. A teljeskörű védettséghez szükséges emlékeztető oltásra 12 hónapos korban kerül sor.

Mire számíthat a pneumococcus elleni oltás után?

Előfordulhat láz, aluszékonyság és/vagy álmatlanság, étvágytalanság, ingerlékenység, illetve helyi reakció (bőrpír, duzzanat) megjelenése.

Milyen betegséget okoz a pneumococcus baktérium?

A pneumococcus baktérium számos súlyos betegséget okoz, mint pl. tüdőgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást.

Hogyan terjed a pneumococcus baktérium?

A baktérium az egészségesek torok-, és orrváladékában is jelen lehet, innen terjed át egyik emberről a másikra cseppfertőzéssel, leggyakrabban köhögéssel és tüsszentéssel.

Melyek a pneumococcus okozta betegségek tünetei?

A pneumococcus baktérium okozta középfülgyulladás esetén láz, hányás, túlérzékenység, fülfájás jelezheti a megbetegedést. Tüdőgyulladás esetén hirtelen kezdetű láz, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, köpetürítés és nagyfokú elesettség a jellemző. A pneumococcus baktérium a véráramba is bejuthat. Ez az állapot lázzal, hidegrázással, tudatzavarral járhat. A pneumococcus baktérium az agyburkon is képes megtapadni és gennyes agyhártyagyulladást okozni. Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A gyors és megfelelő orvosi ellátás ellenére is tartós károsodás maradhat. Az agyhártyagyulladás, a véráramfertőzés és a tüdőgyulladás halálos kimenetelű is lehet.

Bárányhimlő

Milyen betegség a bárányhimlő?

A bárányhimlőt a Varicella-zoster vírus okozza, ragályos, kiütéssel járó betegség, amely leggyakrabban kisgyermekkorban jelentkezik.

Hogyan terjed a bárányhimlő?

A bárányhimlő cseppfertőzéssel terjed, a beteggel való közvetlen érintkezés, váladékokkal frissen szennyezett tárgyak útján.

Melyek a bárányhimlő tünetei?

Láz kíséretében, a test különböző részein jellegzetes, kezdetben apró, majd hólyagos kiütések jelentkeznek, amelyek pörkösödéssel gyógyulnak. A bárányhimlő leggyakrabban enyhe lefolyású, magától gyógyuló betegség, de számos esetben súlyos szövődménnyel jár. A szövődmények jelentős hányada a bőrt érinti, de kifejlődhetnek idegrendszeret érintő szövődmények, és tüdőgyulladás is. Fokozott a fertőzés kockázata a

várandósság során megbetegedő kismamáknál, magzatjuknál, a szülés körül megbetegedő édesanyák újszülöttjei esetében.

Mikor esedékes a bárányhimlő elleni védőoltás?

A védőoltást betöltött 12 és 15 hónapos korban kapják meg a gyermekek. A 2018. július 31. után születettek számára a védőoltás kötelező.

Mire számíthat a bárányhimlő elleni oltás után?

Előfordulhat láz, gyorsan múló bőrjelenség (bárányhimlőszerű kiütés), jelentkezhet fájdalom és duzzanat az injekció beadásának helyén és ingerlékenység.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa a pneumococcus okozta betegségek és a bárányhimlő elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermekegészségügyi kiskönyvet.

Az olthatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagokról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyagok alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A pneumococcus és a bárányhimlő elleni védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása