

## Védőnői tájékoztató a DTPa+IPV+Hib védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

### DTPa+IPV+Hib elleni védőoltás

#### Milyen betegségek ellen véd a DTPa+IPV+Hib védőoltás?

A védőoltás 5 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, D), a **merevgörcs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, Pa), a **járványos gyermekbénulás** (IPV) és a **b típusú Haemophilus influenzae fertőzés** (Hib) ellen véd.

#### Mikor esedékes a DTPa+IPV+Hib védőoltás?

A csecsemők 2, 3, 4, és 18 hónapos korban egy szúrással 5 betegség ellen kapnak védőoltást.

#### Mire számíthat a DTPa+IPV+Hib elleni oltás után?

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

### Diftéria

#### Milyen betegség a diftéria?

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

#### Melyek a diftéria tünetei?

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégén, a mandulákon, az orrban vastkos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

### Tetanusz

#### Milyen betegség a tetanusz?

A tetanusz, más néven merevgörcs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

#### Melyek a tetanusz tünetei?

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerincre és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

## **Szamárcöhögés**

### **Milyen betegség a szárcöhögés?**

A szárcöhögés egy baktérium okozta heveny fertözó betegség. A szárcöhögés cseppfertözéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

### **Melyek a szárcöhögés tünetei?**

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötöhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes szárcöhögés követheti. A kízó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a szárcöhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

## **Járványos gyermekbénulás**

### **Milyen betegséget okoz a járványos gyermekbénulás?**

A járványos gyermekbénulás egy heveny fertözó betegség, amelyet a poliovírus okoz. A vírus széklettel szennyezett kézzel, tárgyakról, élelmiszer, víz közvetítésével jut a szervezetbe.

### **Melyek a járványos gyermekbénulás tünetei?**

A legtöbb esetben a betegség tünetmentes. A tünetes betegség rövid ideig tartó lázzal, felső légúti illetve hasmenéses tünetekkel kezdődik. Az esetek 5%-ban néhány napos láztalan időszak után kialakulnak az idegrendszeri tünetek: fej-, nyak-, gerincfájdalom a végtagok fájdalmával, érzészavarával, bénulással. A tünetek pár nappal az általános, bevezető panaszok után jelentkeznek és 8-10 napig tartanak. Az izmok bénulása véglegessé válhat, amely életre szóló mozgáskorlátozottságot, légzési nehézséget okoz.

## **Haemophilus influenzae b**

### **Milyen betegséget okoz a Haemophilus influenzae b baktérium?**

A Haemophilus influenzae baktérium „b” típusa (Hib) agyhártyagyulladást, a légúti nyálkahártya és a gégefedő nyálkahártyájának gyulladását okozza. A betegség cseppfertözéssel terjed.

### **Melyek a Hib baktérium okozta betegség tünetei?**

Csecsemőkörben egyetlen tünete a bágyadság, táplálhatatlanság lehet, vagy láztalan állapot mellett jelentkező szapora szívverés, sápadt bőrszín is jelezheti a betegséget. A Hib fertözések nagyobb részében gennyes agyhártyagyulladás alakul ki, amely halálos is lehet.

**Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!**

**Megelőzés. Védelem. Védőoltás.**

**A gyermek neve:** .....

Születési helye: .....

Születési ideje: .....

TAJ száma: .....

**Anyja születési neve:** .....

Lakcíme: .....

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa a DTPa+IPV+Hib elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az olthatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyag alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: ..... év ..... hónap ..... nap

Ph

.....  
területi védőnő aláírása

**Alapnyilvántartási száma:** .....

**A DTPa+IPV+Hib védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:**

Dátum: ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
szülő/gondviselő aláírása